



<p>DÉFINITION</p>	<p>Infection aiguë de la gorge et de la bouche survenant l'été et touchant les nourrissons et les enfants âgés entre 1 à 10 ans, par épidémies. N.B: L'herpangine n'est pas due au virus de l'herpès.</p>
<p>SYMPTÔMES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Début brutal avec une fièvre parfois élevée et une fatigue intense. - Inflammation de la gorge. - Apparition de vésicules qui peuvent s'ulcérer. Peuvent se retrouver au niveau du palais et des amygdales et s'étendre aux pieds et aux mains - Peut être accompagné de troubles digestifs, vomissements, pertes d'appétit, maux de tête et douleurs musculaires.
<p>PÉRIODE D'INCUBATION</p>	<p>De 3 à 6 jours.</p>
<p>CONTAGIOSITÉ</p>	<p>Pendant toute la durée de la maladie.</p>
<p>MODE DE TRANSMISSION</p>	<p>Par la salive et les selles.</p>
<p>DURÉE DE LA MALADIE</p>	<p>Environ 10 jours après l'apparition des symptômes.</p>
<p>PRÉVENTION ET MESURE DE CONTRÔLE</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Ne pas exclure l'enfant -Se laver souvent les mains.

¹  CANADA, MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE (2000), *La santé des enfants-en service de garde éducatifs*, Sainte-Foy, Les publications du Québec, 271 pages.