



<p>DÉFINITION</p>	<p>Apparition soudaine de fièvre accompagnée de toux. Et un ou plusieurs des symptômes suivants : Mal de gorge Douleur dans tout le corps «mal partout» Courbatures Fatigue extrême Autres symptômes associé à la souche pandémique (ex : diarrhée)</p>
<p>PÉRIODE D'INCUBATION</p>	<p>Peut aller jusqu'à 7 jours mais plus souvent de 1 à 4 jours</p>
<p>CONTAGIOSITÉ</p>	<p>24 heures avant l'apparition des symptômes et jusqu'à 7 jours après leur début.</p>
<p>MODE DE TRANSMISSION</p>	<p>Par contact direct (une personne tousse et des gouttelettes contaminées atteignent l'œil, le nez ou la bouche d'une autre personne). Par les mains (ou autre) qui sont portées aux yeux, au nez ou à la bouche après avoir été en contact avec une surface contaminée .</p>
<p>PRÉVENTION ET MESURE DE CONTRÔLE</p>	<p>Exclure la personne dès les premiers symptômes jusqu'à la fin de ceux-ci. Appliquerons rigoureusement les mesures d'hygiène et de désinfection ¹</p>

¹  CANADA, MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE (2000), *La santé des enfants-en service de garde éducatifs*, Sainte-Foy, Les publications du Québec, 271 pages.