



DÉFINITION	Infection bactérienne de la peau causée par le streptocoque A ou le staphylocoque aureus. (très contagieuse)
SYMPTÔMES	Lésions cutanées purulentes et croûteuses surtout au visage (nez, bouche, arrière des oreilles); rarement accompagnées de fièvre et de malaise généraux .Les lésions peuvent également envahir le tronc, les mains et les fesses des petits.
PÉRIODE D'INCUBATION	1 à 10 jours.
PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	De 24 à 48 heures après le début des antibiotiques ou jusqu'à ce que les lésions soient croûteuses, si administration d'un traitement local. (onguent)
DURÉE DE LA MALADIE	Rarement plus de 10 jours.
MODE DE TRANSMISSION	Contact direct avec les lésions cutanées ou gouttelettes venant du nez ou de la gorge de personnes infectées ou par jouets contaminés.
TRAITEMENT	Antibiotiques par la bouche ou onguent antibiotique. Si possible, recouvrir les lésion d'un pansement. Nettoyer la peau avec de l'eau savonneuse et bien assécher.
PRÉVENTION ET MESURES DE CONTRÔLE	Augmenter les mesures d'hygiène .S'assurer auprès des parents que le diagnostique à été posé par un médecin.
EXCLUSION	Exclure l'enfant durant au moins 24 heures après le début du traitement. Sans traitement, l'exclure jusqu'à la disparition des lésions. ¹

¹  CANADA, MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE (2000), *La santé des enfants-en service de garde éducatifs*, Sainte-Foy, Les publications du Québec, 271 pages.