




DÉFINITION	Infection de la gorge ou des amygdales causée par la bactérie (streptocoque). Si l'infection s'accompagne d'une éruption cutanée, il s'agit d'une scarlatine.
SYMPTÔMES	<u>Pharyngite, amygdalite</u> :forte fièvre maux de gorge, nausées et vomissement, enflure des ganglions (cou). <u>Scarlatine</u> : en plus des symptômes précédents, langue framboisée et éruption cutanée apparaissant au cou, poitrine, plis coudes,, genoux, aines et (peau qui pèle)
PÉRIODE D'INCUBATION	1 à 5 jours
MODE DE TRANSMISSION	Le plus souvent, par contact avec des gouttelettes provenant du nez et de la gorge des personnes infectées ou porteuses du germes.
PÉRIODE DE CONTAGIOSITÉ	Jusqu'à 24 hr après le début de traitement d'antibiotique. Si pas traitée de 10 à 21 jours
DURÉE DE LA MALADIE	Rarement plus de 7 jours
TRAITEMENT	Antibiotique par la bouche et repos
PRÉVENTION ET MESURE DE CONTROLE	S'assurer auprès des parents que le diagnostic à été posé par un medecin.
Exclusion	Exclure jusqu'à 24 hr après le début du traitement.

LG(2013)

¹  CANADA, MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE (2000), *La santé des enfants-en service de garde éducatifs, Sainte-Foy, Les publications du Québec, 271 pages.*